STIKSTOFGEBREK

PRODUCT	Werkende stoffen	Inhoud
AMINOSOL	Aminozuren	9 % org.geb. N = 110,7 g/l
AMINOMIN	Aminozuren	9,4 % N (min 8% org. geb. N)

GEVOLGEN VAN TEKORT

LICHTGROENE BLADEREN
ROOD VERKLEUREN VAN DE BLADSTELEN
ZWAKKE GROEI,KLEIN BLAD,KLEINE TROSSEN EN DUNNE TWIJGEN
GERINGE MOSTKWALITEIT, DUNNE WIJNEN DOOR ZWAKKE FOTOSYNTHESE

FOSFORGEBREK

PRODUCT	Werkende stoffen	Inhoud
LEBOSOL-Calphos	Phosphor	24,2 % P_2O_5 = 315 g/l
	Nitraatstikstof	3,3 % N,
	Calcium	4,2 % CaO
LEBOSOL-Magphos	Phosphor	30 % P_2O_5 = 430 g/l
	Nitraatstikstof	3 % N
	Magnesium	7 % MgO

GEVOLGEN VAN TEKORT

VUIL BRUINE BLADRANDVERKLEURINGEN
SLECHTE VRUCHTZETTING



KALIGEBREK

PRODUCT	Werkende stoffen	Inhoud
PATENTKALI	KALIUMSULFAAT	30%
(op de bodem in het	MAGNESIUMSULFAAT	10%
voorjaar)	ZWAVEL	20%

GEVOLGEN VAN TEKORT

JONGE BLADEREN WORDEN BRUIN, VERDROGEN EN KRULLEN MAAR BOVEN
OUDERE BLADEREN KRIJGEN VAN VIOLET TOT ZWARTBRUINE BLADPUNTEN
AFRIJPEN VAN HET HOUT IS SLECHT WAARDOOR ZE NIET VORST HARD ZIJN
ZEER ZIEKTE GEVOELIG, SLECHTE BLOEI



RODE MAGNESIUMGEBREK WITTE

PRODUCT	Werkende stoffen	Inhoud
LEBOSOL-Magnesium 500	Magnesium	33 % MgO = 500 g/l

IJZERGEBREK

PRODUCT	Werkende stoffen	Inhoud
LEBOSOL-Eisen EDTA	ijzer	7,3 % Fe = 95 g/l
LEBOSOL-EisenCitrat	ijzer	5 % Fe = 60 g/l

GEVOLGEN VAN TEKORT

WITTE VERKLEURING EN GEEL WORDEN VAN JONGE BLADEREN EN
GROEIPUNTEN , BLADRANDVERDROGINGEN
AFSTERVEN VAN DE DRAAGTAKKEN

ZINKGEBREK

PRODUCT	Werkende stoffen	Inhoud
LEBOSOL-Zink 700	Zink	39,8 % Zn = 700

GEVOLGEN VAN TEKORT

GELE EN WITTE MOZAIEKACHTIGE VLEKKEN TUSSEN DE
BLADNERVEN EN DE BLADEREN BIJVEN KLEIN.
DIEFVORMING WORD HIERDOOR GEACTIVEERD

BOORGEBREK

PRODUCT	Werkende stoffen	Inhoud
LEBOSOL-Bor	Boor	11 % B = 150 g/l

GEVOLGEN VAN TEKORT

BLADEREN WORDEN NIET VOLLEDIG GESPREID EN STAAN BOL
BLADNERVEN EN BLADSTELEN VERDONKEREN
ZE KRIJGEN BOSSIGE GROEI
EN STERKT EEN SLECHTE VRUCHTZETTING